

HKSPID ARTICLE #10



牙/植牙都有牙周病？！

植牙跟真牙都有很多相同之處，兩者都是由牙床骨與牙肉包圍及作出支撐，所以當病人對植牙沒有作出適當的護理，例如良好的清潔習慣，定期到牙醫診所檢查及清洗植牙等，都有機會令植牙患上牙周病。

但由於植體及牙冠部份是由金屬及陶瓷組成，所以並不會有蛀牙的問題。

「學者為植齒牙周病訂下了不同的定義，但簡單來說可歸納為兩大類：

第一類為初期植體周邊的牙肉發炎而並沒有導至周邊的牙床骨缺失；第二類為後期較嚴重的植齒牙周病，會令植體周邊的牙床骨缺失，甚至整支植體鬆脫。

植牙手術失敗的原因有很多，例如手術初期的併發症而導致植體未能癒合、沒有足夠牙床骨去支撐植體、植牙位置不佳而引致的後遺症，好像神經線受損或鼻竇炎等等，但眾多個令植牙失敗的原因中，植齒牙周病可以說是十分常見及其中一個主因，而且一但患者患上植齒牙周病，會比真牙的牙周病更難處理。

植齒牙周病普遍嗎？

其實早於 2008 年，歐洲的一群學者已為植齒牙周病的病發率作出研究，當時結果顯示植齒牙周病的病發率高達 3-5 成。

後來於 2012 年，另一份研究收集了更多不同的文獻作出統計，結果發現經過 5-10 年時間，有約 1 成植牙及 2 成病人會患有植齒牙周病。

即是代表 5-10 年後，每 5 位病人便有 1 位確診患上植齒牙周病，而每 10 支植牙便有 1 支出現該問題。

病發率與嚴重牙周病相約雖然暫時還沒有植齒牙周病於本地的數據，但相信應與其他地區相約。

而根據 2014 年人口普查及衛生署資料顯示，大家經常提及的高血壓與糖尿病於香港市民的病發率都只是約 1 成左右，可常而知植齒牙周病絕對不是一個罕見的牙患。